## **EFICÁCIA**

## Porcilis® PCV ID - Alta resposta imune

A vacinação intramuscular (IM) e intradérmica (ID) induziu uma resposta imune humoral e celular clara e detectável baseada em células secretoras de IgG e IFN-γ, indicando que ambas as rotas de vacinação induzem uma resposta imune sólida.<sup>3</sup>







Grupo ID





## PROTOCOLO DE VACINAÇÃO

$$\label{eq:local_problem} \begin{split} \text{ID: Vacinados com } & \text{Porcilis}^{\textcircled{\tiny{0}}} \text{ PCV ID - intrad\'ermica} \\ & \text{sem agulhas com o dispositivo IDAL}^{\textcircled{\tiny{0}}}. \end{split}$$

IM: Vacinados com Porcilis® PCV - intramuscular.

C: Controle, não vacinados.

## RESPOSTA IMUNE HUMORAL E CELULAR 21 DIAS PÓS-VACINAÇÃO

	ID	IM	С
IgG (média ± dp log2)	2,9±0,4 <sup>b</sup>	3,3±0,17ª	neg
% lg G Soroconversão	96% (23/24)	100% (25/25)	0% (0/26)
IFN-γ (SC/10 <sup>6</sup> PBMC)	17,9ª	26,4ª	2,0 <sup>b</sup>

Sorologia – Ingezim Circo IgG, Ingenasa.

a.b Os valores com sobrescritos diferentes na mesma linha são significativamente diferentes (p < 0.001).</p>
dp= Desvio padrão.